



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Bulletin du Museum d'histoire naturelle

Paris Impr. nationale 1895-1907

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/68686>

t.10 1904: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/27180>

Page(s): Text, Text, Page 545, Page 546, Page 547, Page 548, Page 549, Page 550

Holding Institution: New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by: MSN

Generated 23 April 2024 9:10 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1693979i00027180.pdf>

This page intentionally left blank.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

BULLETIN

DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

ANNÉE 1904

N° 8



PARIS

IMPRIMERIE NATIONALE

MDCCCIV

SOMMAIRE.

	Pages.
Nomination de M. Lebrun comme Correspondant du Muséum.....	529
<i>Correspondance.</i> Présentation de document par M. Debreuil; dons et envois de MM. de Rothschild et Henry; présentations d'ouvrages, par MM. Oustalet, Gréhant et Ramond.....	529
E.-T. HAMY. L'âge de pierre à la Côte de l'Ivoire.....	534
E. OUSTALET. Catalogue des Oiseaux rapportés par la Mission Chari-Lac Tchad.....	536
J. PELLEGRIN. Poissons recueillis par M. Ch. Gravier à Djibouti et à Obock.	543
M. HAGEDORN. Enumeratio Scolytidarum e Venezuela, Guyana et Columbia natarum Musei historico-naturalis Parisiorum, etc.....	545
E. VENTRILLON. Description de Culicides de Madagascar.....	550
L. SEMICHON. La formation des réserves dans le corps adipeux des Mellifères solitaires.....	555
CH. GRAVIER. Sur un type nouveau de la famille des Capitelliens : <i>Scypho-</i> <i>proctus</i> nov. gen. <i>djiboutiensis</i> nov. sp.....	557
A. BILLARD. <i>Haleremita parvula</i> , nouvelle espèce d'Hydroïde marin.....	561
M. A. HÉRUBEL. Liste des Sipunculides et des Echiurides rapportés par M. Ch. Gravier du golfe de Tadjourah (mer Rouge).....	562
ANTHONY et CALVET. Note sur un <i>Balænoptera physalus</i> L. capturé à Cette le 7 octobre 1904.....	566
MAURICE NICLOUX. Sur un procédé d'isolement du cytoplasma.....	567
— Action lipolytique du cytoplasma de la graine de ricin. Étude des lois qui régissent cette action.....	569
— L'agent lipolytique du cytoplasma : la lipaséidine, n'est pas un fer- ment soluble.....	571
— Mécanisme d'action du cytoplasma (lipaséidine) dans la graine oléagi- neuse en voie de germination. Réalisation synthétique <i>in vitro</i> de ce mécanisme.....	573
ED. BUREAU. Deuxième étude sur les Bambusées. Le <i>Phyllostachys aurea</i> Rivière.....	575
P. COMBES fils. Sur les couches sparnaciennes inférieures d'Auteuil.....	583
TABLES des matières du volume X (1904).....	587

Parmi les espèces les plus remarquables, il y a lieu de citer en outre deux spécimens d'*Encheliophis vermicularis* Müller; ce sont de petits Poissons plus ou moins vermiformes, assez voisins des *Fierasfer*, qui furent recueillis au milieu des ramifications de Madrépores. Cette espèce, dont les types provenaient du Japon, ne doit pas être très rare à Djibouti, car M. Coutière, lors de son voyage, en avait rapporté aussi de cette localité un exemplaire, qu'il indiquait comme probablement parasite des Holothuries⁽¹⁾. D'après M. Gravier, la teinte générale de ces Poissons est claire, rosée à la partie antérieure, verte en arrière.

Comme Poissons de Polypiers, il y a lieu de citer plus particulièrement les *Salarias*, tous les Gobiidés, les *Pseudochromis*, les *Dascyllus* ou *Tetra-drachmum*, de jeunes *Héliastes* et de jeunes *Apogon*.

M. Gravier a capturé à Obock, sur le récif de la Clochetterie, un jeune spécimen d'*Epinephelus Stoliczkæ*, espèce décrite par Day, il y a relativement peu d'années.

Les *Branchiostoma* ou *Amphioxus* proviennent d'un dragage fait à Djibouti, à une profondeur de 6 mètres, dans les herbiers et dans le sable à l'embouchure de la rivière Ambouli⁽²⁾.

ENUMERATIO SCOLYTIDARUM E GUYANA, VENEZUELA ET COLUMBIA NATARUM MUSEI HISTORICO-NATURALIS PARISIORUM, DESCRIPTIONIBUS SPECIERUM NOVARUM ADJECTIS,

AUCTORE D^r MAX HAGEDORN, HAMBURGENSE.

PARS PRIMA.

Scolytus productus nov. sp. 1 spécimen ♂. — Patria : San Esteban Venezuelæ (E. Simon).

CAMPTOCERUS AENEIPENNIS Fabricius, *Systema Eleutheratorum*, t. II, p. 392. Compluria specimina. — Patria : Guyane française, Camopi. « Dans le bois d'une Euphorbiacée (Mapa) » (F. Geay). Guyane française (D^r E. Rech).

(1) H. COUTIÈRE. Observations sur quelques animaux des récifs madréporiques de Djibouti, *Bull. Mus. Hist. Nat.*, 1898, p. 240.

(2) Quelques Reptiles et Batraciens ont été aussi recueillis par M. Gravier; ce sont, d'après la détermination de M. Mocquard : *Pristurus rupestris*, Blanford; *Eremias mucronata* Blanford; *Bufo Blanfordii* Boulenger; *Bufo Dodsonii* Boulenger; en outre, une forme de Batracien associée du groupe des *Firmistornia*, qui paraît nouvelle et sera décrite ultérieurement.

- CAMPTOCERUS AURICOMUS Blandford, *Biologia Centrali-Americana*, vol. IV, pt. 6. 1895. 4 specimina. — Patria : Camopi Guyanæ (F. Geay).
- NIGER Fabr., *l. c.* — Patria : Camopi Guyanæ (F. Geay). 1 specimen.
- **striatulus** nov. sp. 3 specimina ♀. — Patria : Camopi Guyanæ (F. Geay).
- BOTHROSTERNUS TRUNCATUS Eichhoff, *Berl. ent.*, 1868, p. 150. 3 specimina. Patria : San Esteban (E. Simon) et Puerto Cabello Venezuelæ (E. Simon).
- EUPAGIO CERUS DENTIPES Bldfd., *l. c.*, 1 specimen. — Patria : Colonia Tovar Venezuelæ (E. Simon).
- Meringopalpus fallax** nov. gen., nov. sp. 1 specimen. — Patria : Colonia Tovar Venezuelæ (E. Simon).
- PHLOEOBORUS RUDIS Erichs., *Wiegmanns Archiv*, 1836, t. I. 1 specimen. — Patria : Guyana, rivière Lunier (F. Geay).
- ELONGATUS Chapuis, *Synopsis des Scolytides*, p. 221. 1 specimen. — Patria : Guyana (Mélinon).
- RUGATUS Bldfd., *l. c.*, 3 specimina. — Patria : La Mana Guyanæ (Mélinon).
- PHLOEOTRIBUS SETULOSUS Klug, Chapuis, *l. c.*, 4 specimina. — Patria : Sarare Venezuelæ (F. Geay).
- ARMATUS Bldfd., *l. c.*, 3 specimina. — Patria : Colonia Tovar Venezuelæ (E. Simon) et Cayenna (Baudouin d'Aulne).
- DRYOTOMUS PUBERULUS Chap., *l. c.*, 1 ♂. — Patria : Guyana, rivière Lunier (F. Geay).
- HEXACOLUS GLABER Eichhoff *Ratio tomicinorum*, 1879, p. 307. 1 specimen. — Patria : Venezuela (E. Simon).
- HYPOTHENEMUS ERUDITUS Westwood, *Transact. ent. soc. London*, 1834, p. 34. 1 specimen. — Patria : Camopi Guyanæ (F. Geay).
- COCCOTRYPES PYGMAEUS Eichh., *l. c.*, compluria specimina. — Patria : Guyana, Haut-Carsevenne. « Dans les noix d'un Palmier » (F. Geay).
- XYLEBORUS SPATHIPENNIS Eichh., *l. c.*, compluria specimina. — Patria : Guyana, Camopi, rivière Lunier, Tumuc-Humac, etc. (F. Geay).
- **conifer** nov. sp. 1 ♀. — Patria : Guyana, Rivière Lunier (F. Geay).
- RUFITHORAX Eichh., *l. c.*, compluria specimina. — Patria : Camopi Guyanæ (F. Geay).
- CAPUCINUS Eichh., *l. c.*, compluria specimina. — Patria : San Esteban Venezuelæ (E. Simon) et Camopi Guyanæ (F. Geay).
- Xyleborus camopinus** nov. sp. Compluria specimina. — Patria : Camopi Guyanæ (F. Geay).
- PROGER Eichh., *l. c.*, 2 ♀. — Patria : Camopi Guyanæ (F. Geay).
- DECLIVIS Eichh., *l. c.*, 1 ♀. — Patria : Camopi Guyanæ (F. Geay).
- INSIGNIS Eichh., *l. c.*, compluria specimina. — Patria : Camopi Guyanæ (F. Geay).

CORTHYLUS COMPRESSICORNIS Fabr., *l. c.*, 1 ♀. — Patria : Camopi Guyanæ (F. Geay).

— **ABBREVIATUS** Eichh., *l. c.*, 1 ♀ 1 ♂. — Patria : Colonia Tovar Venezuelæ (E. Simon).

— **PAPULANS** Eichh., *l. c.*, compluria specimina. — Patria : Camopi Guyanæ (F. Geay).

Phthorius edentatus nov. sp. 4 specimina. — Patria : Colonia Tovar Venezuelæ (E. Simon).

PTEROCYCLON EXILE Eichh., *l. c.*, 1 specimen. — Patria : Colonia Tovar Venezuelæ (E. Simon).

— **dimidiatum** nov. sp. 5 specimina. — Patria : Camopi Guyanæ « Dans le bois d'une Euphorbiacée (Mapa) » (F. Geay).

Amphicranus Lesnei nov. sp. 2 specimina. — Patria : Colombie, vallée de Cauca (R. Oberthür dedit).

Scolytus productus nov. sp.

Nitidus, ater, antennis, pedibus elytrisq. brunneis, fronte depressa dense aciculata, pilis incurvatis circumdata; prothorace latitudine longiori irregulariter punctato, punctis ad latera maximis, disco subtilibus; elytris prothorace longioribus, parallelis, punctato-striatis, interstitiis præsertim versus apicem et latera subcarinulatis, limbo apicali granulato punctato et setisque brevibus insperso, angulo suturali acute producto; abdominis segmento 2° tuberculo conico compresso ornato.

Long., 3 millim. — Patria : San Esteban Venezuelæ, 1 ♂.

Camptocerus striatulus nov. sp.

Ovalis, opacus, ater, antennis tarsisque piceis, fronte convexa inter oculos transverse impressa et longitudinaliter carinata, antennis simplicibus; prothorace longitudine paulo latiori, apicem versus coarctato, subtiliter et regulariter punctato, lateribus apiceque longitudinaliter aciculatis, linea mediana lævi obsoleta ornato; elytris a basi versus apicem angustatis striato-punctatis, interstitiis vage et sat fortiter punctatis.

Long., 3 millim. 5. — Patria : Camopi Guyanæ 3 ♀.


Meringopalpus nov. gen. **Hylesinidarum**.

Caput subexsertum, rostello brevi auctum. Mentum oblongum versus basin sensim angustatum, lateribus rectis, apice truncato, ligula basi inserta, mento angustior, spinis compressis acutis dense ornata; palpi articulo 1° magno sequentibus minoribus, 1° et 2° intus spinis compressis acutis rigidis, in linea semiorbiculari positus, notatis maxillæ mala versus apicem angustata et producta, marginæ interno membranaceo spinulis compressis obtusis et pilis subtilibus, extus pilis longissimis ciliata, squama palpigera distincta; oculi antichi emarginati. Antennæ inter basin mandibularum et emarginationem oculorum insertæ funiculo 7-articulato, articulo 1° globoso, apice truncato, magno, 2° multo minore, obconico, ceteris transversis, latitudine crescentibus; capitulo magno solido,

ovali, spongioso, vittis duabus obscuris notato; prothoracis superficies et inferior pars marginæ acuto distincto sejunctæ sunt; prosternum processu nullo. Coxæ anteriores subcontiguæ, mediæ late distantes, posteriores approximatae. Tibiæ anteriores ad apicem dilatatae, extus spinis duabus ornatae, ceterum integræ, ad tarsos recipiendos sulcatae, mediæ et posticæ valde dilatatae compressæ extus serratae. Tarsi recepti articulis 1°, 2°, 3° subæqualibus. Corpus ovale elytra declivia, stria suturali impressa.

Meringopalpus fallax nov. sp.

Oblongo-ovalis, piceo-brunneus, opacus, antennis tarsisque dilutioribus, prothorace transverso, latitudine brevior, basi truncato, angulis posticis rectis rotundatis, lateraliter fortiter arcu æquali subcircinato ad apicem angustato rotundato, marginæ apicali elevato crenulato, intervallo mediano in partes æquales diviso; supra elevato-gibbo, anterieus tuberculis versus apicem majoribus exasperato, postice dense punctato, linea mediana lævi a marginis apicalis intervallo ad gibbum extensa; nigro-piceo, limbo postico rufescente.



Meringopalpus fallax Hagedorn.

1. Antenna. — 2. Mentum et ligula. — 3. Maxilla.

Capite nigro, dense punctato, rostro medio carinato apice impresso. Scutello triangulari minimo opaco, brunneo. Elytris a medio ad apicem valde declivibus, latitudine thoracis et eo dimidio longioribus, basi truncatis, humeris rectis subrotundatis, lateribus subrectis parallelis, apice conjunctim rotundatis; supra cylindrice convexis, piceo-brunneis, opacis, striato-punctatis, interstitiis latis,

planis, ad basin rugulosis, pilis longioribus sparsim ornatis, declivitate densius pubescente, stria suturali impressa.

Long., 3 millim. 5. — Patria : Colonia Tovar Venezuelæ, 1 spec.

Xyleborus conifer nov. sp.

Elongatus, cylindricus, castaneus, nitidus, pallide rufescenti-villosus, thorace elongato, cylindrico, anterieus granulato, posterius parce subtiliter punctato, pronoto a prosterno margine rotundato distincto; elytris thorace dimidio longioribus, striato-punctatis, interstitiis planis uniseriatim punctatis, apice densius et longius pilosis, oblique excavato-truncatis, singulo interstitio 2° tribus conis validis, nigris, æqualibus armato, fundo declivitatis opaco, irregulariter punctato, ambitu elliptico et sutura tuberculis obsoletis notatis.

Long., 5 millim. 5. — Patria : Rivière Lunier Guyanae, 1 ♀.

Notabilis ille Xyleborus attinet ad turmam ***** *monographiæ tomicinorum* et habeat locum suum post *X. procerem* Eichh.

Xyleborus camopinus nov. sp.

Brevis, ovalis, niger, nitidus, antennis ferrugineis, pedibus brunneis, fronte longitudinaliter rugulosa, transverse impressa, linea mediana elevata; prothorace subgloboso, medio valde gibbo, apice tuberculis prominulis submucronato, basi immarginato antice tuberculis minoribus majoribusque scabrato, postice subtiliter punctulato; elytris latudine thoracis et illo tertia parte longioribus, subtilissime lineato-punctatis, interstitiis planis integris, declivitate multo ante medium incipiente, ovali excavata, opaca, irregulariter punctata, dentibus duobus, apice unica seta flava ornatis, sat magnis acutis, callo elevato conjunctis, sutura in ea elevata integra, ambitu tuberculosus acustiusculis numerosis armato.

X. splendido Schauf. (*Berlin Ent.*, 1897, p. 111) valde similis et affinis, sed thoracis basi non marginata, elytris non striato-punctatis, interstitiis lævibus, et sculptura declivitatis posticæ elytrorum dignoscendus.

Compluria specimina corpore toto pallide testaceo, excepta truncatura obscuriore, variant, prout individuum plus vel minus perfecte coloratum est.

Long., 5 millim. — Patria : Camopi Guyanae.

Habeat locum suum ad *X. insignem* Eichh.

Phthorius edentatus nov. sp.

Linearis, cylindricus pallide testaceus, exceptis capite, dimidio anteriore thoracis, meso et metasterno et margine externo elytrorum nigro-piceis, glaber, nitidus; fronte concava, opaca, profunde punctata, linea mediana lævi ornata; prothorace oblongo, lateribus parallelis apice crenulato, basi truncato, supra convexo, anterieus tuberculis concentrice positis armato, posterius subtilissime punctulato; elytris cylindricis, latitudine thoracis et illi fere dimidio longioribus, lateribus rectis parallelis, apice singulatim obtuse rotundatis, adeo ut ad angulum suturalem emarginato-sinuata lateque divaricata exhibeantur, supra irregulariter punctulatis, apice oblique at determinate excavato-truncato, ambitu formam cordis inversi exhibente, acute elevato, subtilissime crenulato, fundo subnitido, crebre punctato; pedibus pallide testaceis.

Long., 3 millim. — Patria : Colonia Tovar Venezuelæ,

Pterocyclon dimidiatum nov. sp.

Elongatum, pallide testaceum nitidum, capite globoso, fronte punctata convexa; prothorace dimidio longitudinis corporis, elongato cylindrico, basi marginato, apice obtuse rotundato, subtilissime crenulato, supra cylindrice convexo, anterieus rugulis imbricatis exasperato, posterius subtilissime punctulato; elytris longitudine et latitudine thoracis, cylindricis, lateribus rectis parallelis, supra irregulariter subtilissime punctatis, apice subrecte ac determinate truncato, depressione apicali fere verticali retusa, fundo retusionis convexiusculo, circulari dense punctato, opaco, sutura in eo elevata integra, in utroque elytro inter suturam et ambitum lateralem superius callo elevato tuberculiformi notato, ambitu retusionem totam circumcludente acute elevato integro, margine apicali in singulo elytro rotundato, medio communiter profunde emarginato-sinuato; pedes pallide testacei.

Long., 2 millim. — Patria : Camopi Guyanæ.

Amphicranus Lesnei nov. sp.

Elongatus, nitidus glaber, niger, capite et pronoto sanguineis, tarsis fuscorufis, capite in thorace recondito oculis, mandibulis et antennis nigris; prothorace magno, oblongo basi truncato, angulis posticis rectis, lateribus subparallelis, margine apicali trisinuato, supra toto sanguineo, excepto margine basali nigro, cylindrice convexo, antice tuberculis majoribus transversim ordinatis, postice rugis transversis, disco subtilioribus ornato; elytris cylindricis, latitudine thoracis et illo fere dimidio longioribus, lateribus rectis parallelis; margine apicali singulatim ad angulum suturalem oblique rotundato, supra nigris, nitidis, glabris, tenuiter subseriatim punctulatis, posterius oblique truncatis, excavato-retusis, truncatura prope basin incipiente, ambitu subacute elevato, in singulo elytro subæqualiter trisinuato, dentibus duobus armato, uno minore prope suturam in medio, altero majore integro postmedium elytri positus; fundo excavationis parce subtiliter, in limbo apicali tamen creberrime rugulose punctato ibique longius tenue pubescenti; carinula transversa acuta a dente postico sejuncta inter suturam et marginem lateralem limbo apicali valde dilatato producto, sutura elevata usque apicem applicata, elytra itaque apice non divaricata; corpus subtilis punctulatum, abdomine nigro, pedibus nigris, tarsis fusco rufis.

Long., 7 millim. 5 et 8 millim. 5. — Patria : Vallée de Cauca, Columbia.

Statura e. *Alegantis* Eichh. et forte alter sexus ejusdem, sed colore ab eo diversus. 2 specimina.

DESCRIPTION DE CULICIDES DE MADAGASCAR,

PAR M. E. VENTRILLON,

PHARMACIEN DES TROUPES COLONIALES À MADAGASCAR.

Culex flavus n. sp.

♂. Longueur, trompe comprise, 6 millim. 5.

La tête est couverte d'écailles en fourchette jaunes; les yeux sont noirs;